



## Vážený vlastníku lesa!

Letošní velmi teplé a suché léto vyrazně urychlilo vývoj kúrovčů a umožnilo jim silné zvýšit jejich početní stavy. Proto je možné na řadě míst naší republiky vidět jednotlivé smrky či „kola“ smrků s opadávajícím lehličím a odlupující se kúrou. V opadane kúře se nachází řada malých, cca 2 mm velkých otvorů, a v lýku pod kúrou řada chodbiček.

Toto všechno jsou bohužel neklamné známky napadení kúrovci - převážně druhu lýkožrout smrkový (lat. *Ips typographus* - odtud mezi lesníky někdy používaný název „typograf“), případně i dalších druhů, zejména velikosti menšího lýkožrouta lesklého (*Pityogenes chalcographus* - „chalkograf“).

V případě, že se stromy napadené kúrovci nachazejí i ve vašem lese, je třeba provést opatření k zamezení jejich dalšího šíření. Je to nejen proto, že přemnožený kúrovec může dále hubit smrky ve vašem lese, ale i v lese vašich sousedů. I z tohoto důvodu na ochranu lesa pamatuje lesní zákon č. 289/1995 Sb., v platném znění, v ustanoveních § 32 a 33:

**§ 32 - 1)** Vlastník lesa je povinen provádět takova opatření, aby se předchazeilo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména:

a) zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně informovat příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření,

b) preventivně branit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů.

2) Při ... přemnožení škůdců ... je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků.

**§ 33 - 1)** Vlastník lesa je povinen přednostně provádět nahodilou těžbu tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů.


Detailněji jsou uvedená ustanovení upravena vyhláškou MZe č. 101/1996 Sb., v platném znění, kde jsou lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý uvedeni jako kalamitní škůdci.

## Proč Vám předáváme tuto informaci?

Vlastník lesa by i v tomto případě měl postupovat po dohodě se svým odborným lesním hospodářem, který zajistí dohled nad správným postupem v ochraně lesa. Současné máme za to, že vlastník lesa musí vědět, proč jsou odborným lesním hospodářem stanovovány někdy i zdánlivě přísné termíny. Pravě tak jsme přesvědčeni, že také vlastník lesa se musí sám podílet na kontrole zdravotního stavu svých lesů, což vyplývá i z výše uvedeného zákona. K tomu, aby se v uvedené problematice mohl orientovat, by měl přispět rovněž tento leták.

## Jak tedy nejlépe při zjištění kúrovcových stromů postupovat?


Nejprve je třeba ověřit, jestli se skutečně jedná o lýkožrouta smrkového nebo lýkožrouta lesklého.



Obr. 1: Lýkožrout smrkový

Ček, který v kůře hladá tzv. snubní komůrku (na odloupnuté kůře zpravidla nebyvá vidět), do které láka samičky. Ty po oplodnění ze snubní komůrky hladají kolmo vzhůru nebo dolů tzv. matečné chodby. Podle počtu samiček proto požerky mají 1 až 3 ramena, zpravidla 6 - 12 cm dlouha. Po obou stranách matečné chodby pak samičky kladou vajíčka a z nich vylíhlé larvy hladají přibližně kolmo na matečnou chodbu tzv. chodby larvální, které se rozší-

řují podle toho, jak larvy postupně rostou. Na konci larvální chodby se pak kuklí. Tímto postupem vzniká charakteristicky požerek lýkožrouta smrkového (viz obr. č. 2).



Obr. 2: Pozerek lýkožrouta smrkového pod kúrou v lýku

Po vylíhnutí pak noví brouci mohou pokračovat v tzv. úživném žiru a vytvářet změř chodeb zakončených tzv. výletovým otvorem. Celý tento cyklus trvá podle počasi cca 6 - 10 týdnů a právě v tomto období je proto nutné napadene stromy nalézt a kúrovce asanovat. Pokud se to nepodaří, tak nová, početně silnější generace lýkožrouta smrkového napadne další zdravé stromy a tato skutečnost se může stát počátkem budoucí kalamity.

Lýkožrout lesklý je cca 2 mm dlouhy leskle hnědý brouk. Přednostně napadá mladší porosty do 40 let. U starších porostů často doprovází lýkožrouta smrkového a napadá zejména vrcholky se slabší kúrou a větve. Ze snubní komůrky, která opět nebyva vidět, hladá všemi směry zpravidla 5 i více samiček kratší (cca 3 - 4 cm) matečné chodby. Spolu s larválními chodbami tak opět vznika charakteristicky požerek (viz obr. č. 3).

## Co dál s těmito škůdci?

Je potřeba vyhledat všechny napadené stromy. Napadení se projevuje již zmiňovaným opadem jehličí nebo odlupující se kúrou. Pokud je kmen napaden až do dolní



Obr. 3: Požerok lýkožrouta lesklého

části, jsou v kůře patrně vletove otvory (průměr otvoru cca 2 mm). Na patě kmene nebo za šupinami kůry pak zůstávají rezavohnedě drtinky, které kůrovci vyhazují z hladaných chodbiček. Strom vzápěti po napadení kůrovci hyne, přesto koruna zůstává ještě určitou dobu zelená. Tyto stromy proto mohou ujít pozornosti a je proto potřeba v okoli nalezených stromů důkladně prohlédnout i stromy okolní. Napadene stromy doporučujeme pro lepsi orientaci nejprve vyznačit (barvou, paskou nebo třeba sekýrkou) a pak teprve pokacet a provést asanaci.

### Jak se stromy asanují?

Nejlevnější asanace je na dřevozpracujícím závodě, kde je kmen odkorněn a porézán. Takže nejlepší je dřívě rychle odvézt na některou z provozoven. To lze ale provést jenin tehdy, máte-li skutečně zajištěn rychlý odvoz z lesa ke zpracování. Pokud vám však dřívě zůstane v lese, hrozi, že kůvec ze zpracovaného dřívě opět vylétne a vynaložené úsilí a prostředky byly zbytečné. Při objednávání zpracování kůrovcových stromů je proto vždy vhodnější objednat i asanaci stromů ihned po pokacení a odvětvení. Pokud se pod kůrou nachazejí larvy, stačí ji oloupat. Larvy nejsou schopny další existence a rychle hynou. Tento postup lesníci používají s úspěchem bezmála 170 let. Kvalitu práce si můžete zkontrolovat, případně práci provést, sami. Druhou možností je chemická asanace povolenymi insekticidy. V tomto případě, vzhledem k nutnosti dodr-

žet technologicky postup, doporučujeme využít spíše služeb specializované firmy, případně postup konzultovat se svým odborným lesním hospodářem.

### Co s klestem napadeným menším z obou kůrovoců?

Na obranná opatření proti lýkožroutu lesklému je nutno dbát zejména v mladších porostech a v nižších nadmořských výškách. Chemická asanace nebývá v tomto případě dostatečně účinná, protože se málokdy podaří zajistit postřik větví ze všech stran. Nejvhodnější je proto spálení nebo štěpkování napadených zbytků. Při pálení musíme dodržovat protipožární opatření.

### Pokud se dřívě a klest zasanuje, nehrozí již další nebezpečí?

Je nutne vždy počítat s tím, že nikdy není zahuben veškerý kůvec. Vždy je část populace mimo asanovane dřívě – buď pravě vyhledává nove stromy nebo zimuje. Proto se k jeho odchytu používají od jara do podzimu různá lapaci zařízení – lapáky a lapače.


Lapák je pokacený zdravy strom, který se odvětví a větvemi přikryje (viz obr. 4).



Obr. 4: Pokácený zdravý strom přikrytý větvemi slouží jako lapák

Káci se zpravidla na okraji porostu v místě asanovaných stromů, tzv. kůrovcových ohnisek, tak, aby nebyl zcela ve stínu. Lapák se musí kontrolovat – hledá se počet závrtů a rychlosť vývoje kůrovčů. Pokud počet závrtů v místě jejich nevětší kon-

centrace převýší 1 závrt/dm<sup>2</sup>, snižuje se účinnost a proto se musí kácer další. Důležitá je ale kontrola vývoje kúrovčů - lapák je nezahubí, ale pouze odchytává. Proto pokud larvální chodby dosáhnou délky nad 3 cm, je potřeba zajistit asanaci - lapáky odvézt z lesa nebo odkomít. Na asanaci je potřeba myslet předem a pokud je riziko, že se nepodaří včas, je lepší zvolit druhou metodu - lapač.



Obr. 5: Lapač

Lapač je odchytové zařízení (viz obr. 5), které lze zakoupit u firem obchodusujících s lesnickým materiálem. Do něho se musí zavésit odpárník, z kterého se uvolňuje látká - feromon, který kúrovce do lapače láka. Jejich účinnost je dnes přibližně osmičlenná, proto na jednu sezónu jsou potřeba cca tři odpárníky na jeden lapač. Lapač se instaluje na volnou plochu 10 až 20 m od smrkového porostu tak, aby nebyl zakryt buřením. Kontrola se provádí v 7 - 14 denních intervalech. Při ní se stanovi počet odchycených kúrovčů, které je třeba zahubit, a vyčisti se sběrná nádoba.

### Kdy kúrovci napadají nové stromy?

Začátek rojení (letové aktivity) byvá obvykle okolo 20. dubna, záleží však na teplotě. Letová aktivita kúrovčů v letním období probíhá při teplotách nad 16 °C.

Na jaře je potřeba nejprve několik teplých dní k ohřátí hrabanky, kde kúrovec obvykle zimuje, proto nezačíná létat ihned po otepleni. To neplatí, pokud v lese zůstane stát kúrovcové stromy - koruny se ohřejí rychleji. K urychlení počátku rojení také přispívá v posledních letech obvyklý rychlý přechod „ze zimy do léta“ Pak kúrovec létá celé léto, vždy po dokončení nové generace se jeho množství zvýší. K ukončení letů dochází až po ochlazení na podzim, zpravidla v první polovině října, ale opět záleží na počasi. Pak již nedochází k napadání nových stromů, ale při teplotách nad bodem mrazu pokračuje vývoj kúrovčů v lýku napadených stromů. Proto se přes celé zimní období mohou objevovat kúrovcové stromy, které prozradí odlupující se kůra nebo za slunných dnů rezavějící jehličí. Ty je potřeba do začátku nového rojení vyhledat a zajistit jejich zpracování a odvoz z lesa.

### Je tedy třeba bát se kúrovčů?

Systém ochrany proti kúrovčům je založen především na preventci. Je potřeba z lesa včas odstraňovat veškeré dříví, ve kterém by se kúrovec mohl vyvijet, zejména vyrraty a zlomy. Pokud po objevení kúrovcových stromů zajistíte jejich asanaci a provedete popsaná opatření, s velkou pravděpodobností dosáhnete uspěchu.

Doufáme, že tento leták vám přinese informace potřebné pro orientaci a přispěl tak ke zdánemu růstu vašeho lesa. Vzhledem k šíři problematiky vám přesto doporučujeme konzultovat vaše kroky s vaším odborným lesním hospodářem.

**Lesy České republiky, s. p.  
Váš partner při hospodaření v lesích**

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.  
lesní správa  
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Ing. Vít Šimurda  
tel.: 605 223 659

Bližší informace můžete získat i na tel.: +420 605 223 961 nebo e-mailem na [pulpan@lesy.cz](mailto:pulpan@lesy.cz)

